


耐舒樂  
FOSTER  
NEXThaler<sup>®</sup>

Beclomethasone+Formoterol




## Foster NEXThaler<sup>®</sup> 肺舒坦耐舒樂 吸入器使用說明

本說明書僅提供已處方此藥品之患者

請詳閱 Foster NEXThaler<sup>®</sup> 肺舒坦耐舒樂包裝盒內的藥品說明書，瞭解本藥物的重要資訊



## 如何使用肺舒坦耐舒樂（小紅帽）？



### 開

- 把保護蓋打開到底
- 朝吸入器以外的地方長吐一口氣



### 吸

- 雙唇確實含著吸嘴，並以長而穩定的方式深吸一口氣
- 聽到“喀”的一聲，代表已正確吸入藥物。請持續吸氣 1-2 秒
- 吸氣完畢後，移去吸入器並閉緊雙唇，然後盡可能的閉氣 5-10 秒



### 關

- 關閉保護蓋，可發現劑量窗格數字減少
- 使用完畢請用清水漱口（請勿吞服）
- 如有需要可使用乾布或紙巾清潔吸入器，勿用水清洗吸入器

## 如何確保您完整且正確吸入藥物？



### 吸入藥物時

#### 聽

您會聽到“喀”的一聲



### 吸入藥物時

#### 嚐

您會感覺到嘴裡有些許甜甜的味道



### 吸藥完畢時

#### 看

請蓋上外蓋，同時檢查劑量窗格的數字是否有減少

衛教影片  
請掃描此 QR Code



### 肺舒坦耐舒樂乾粉吸入劑 100/6 mcg/dose

衛署藥輸字第 026816 號

【主要成分】100 微克 beclometasone dipropionate anhydrous，6 微克 formoterol fumarate dihydrate。【適應症】氣喘：維持與緩解療法，適用於需規律使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2-致效劑合併治療的氣喘病人。慢性阻塞性肺病：患有較嚴重之慢性阻塞性肺病（FEV<sub>1</sub> 少於預測值之 50%）及有反覆惡化病史，已定期使用長效型支氣管擴張劑，而仍有明顯症狀病人之治療。【用法用量】氣喘：一天 2 次，每次吸入 1 或 2 劑；維持與緩解療法：每日劑量上限為 1 天 8 劑。慢性阻塞性肺病：一天 2 次，每次吸入 2 劑。【不良反應】顫抖、肺炎（於慢性阻塞性肺病病人）... 等。【警語】對於罹患下列疾病的病人，使用 Foster NEXThaler 時應特別小心：心律不整、原發性主動脈瓣下狹窄、阻塞性肥厚心肌症、缺血性心臟病、重度心衰竭、重度動脈性高血壓及動脈瘤。其他必須謹慎使用 Foster NEXThaler 的病人，包括：甲狀腺毒症、糖尿病、嗜絡細胞瘤，與未治療的血鉀過低症。【禁忌】對 beclometasone dipropionate、formoterol fumarate dihydrate 或本品所含賦形劑成分產生過敏反應者。

資料僅供醫護專業人員參考，完整資訊請見仿單說明

耐舒樂  
FOSTER  
NEXThaler  
Beclomethasone+Formoterol